



× Cupressocyparis leylandii



Wysokość	5 - 6 m
Szerokość	6-8m
Korona	columnar to narrow pyramidal, dense crown
Kora i gałęzie	twigs light reddish brown, bark reddish brown, slightly flaking
Liście	pointed scales, dull medium green, evergreen
Kwiaty	round, reddish-brown cones, 2 cm
Owoce	C.J. Leyland, Leighton Park, Welshpool, Wales, 1888
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any well-drained, sufficiently moist soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na wiatr
Zastosowanie	w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, iglak soliterowy, krzew soliterowy
Pochodzenie	Grote zuilvormige tot smal piramidale conifeer met een dichte vertakking, die gemakkelijk kan uitgroeien tot een boom van 15 tot 30 m hoogte. De bast is roodbruin en laat op latere leeftijd los in lange, vezelachtige platen. De jonge twijgen zijn eerst groengeel, later licht roodbruin. Het loof is dof middengroen. De boom groeit op alle gronden, mits goed doorlatend en voldoende vochtig, en verdraagt ook veel wind. Ze behoort, naast verschillende cultivars van Chamaecyparis lawsoniana en Thuja, tot de meest populaire haagplanten. De van nature smalle habitus is een voordeel bij het gebruik als haag en daarbij is de boom zeer goed te snoeien. Vanwege de krachtige groei moet er twee keer per jaar worden gesnoeid en dan ontstaat een zeer dichte haag. De boom ontstond in 1888 uit een kruising tussen Chamaecyparis nootkatensis en Cupressus macrocarpa. Nieuwe inzichten leidden ertoe dat C. nootkatensis in een ander geslacht werd ingedeeld (Xanthocyparis). Dit had tot gevolg dat de hybridesoo
Synonimy	× Cupressocyparis leylandii

Duże drzewo iglaste o pokroju kolumnowym lub wąsko piramidalnym, gęsto rozgałęzione, osiągające wysokość od 15 do 30 m. Kora jest czerwonawo-brązowa i w późniejszym okresie życia rozpada się na długie, włókniste płyty. Młode gałązki są początkowo zielono-żółte, później jasnoczerwono-brązowe. Liście są matowe, średnio zielone. Drzewo to rośnie na wszystkich glebach, jeśli są dobrze przepuszczalne i

wystarczająco wilgotne, a także toleruje dużo wiatru. Wraz z różnymi odmianami *Chamaecyparis lawsoniana* i *Thuja* jest jedną z najpopularniejszych roślin żywopłotowych. Jego naturalnie wąski pokrój jest zaletą przy stosowaniu jako żywopłot, a ponadto drzewo bardzo dobrze się przycina. Ze względu na swój energiczny wzrost, powinno być przycinane dwa razy w roku, tworząc bardzo gęsty żywopłot. Drzewo powstało w 1888 roku ze skrzyżowania *Chamaecyparis nootkatensis* i *Cupressus macrocarpa*. Nowe spostrzeżenia doprowadziły do zaklasyfikowania *C. nootkatensis* do innego rodzaju (*Xanthocyparis*). W rezultacie nazwa gatunku hybrydowego $\times$ *Cupressocyparis* dla *C. leylandii* nie mogła zostać zachowana. Aby zminimalizować zmianę, wybrano $\times$ *Cuprocyparis*.