



Cedrus libani 'Fastigiata'



Wysokość	20 - 25 (40) m
Szerokość	6-10m
Korona	narrow pyramidal, dark, dense crown
Kora i gałęzie	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
Liście	needles, blue-green, 2 - 2.5 cm, evergreen
Kwiaty	unremarkable, fragrant flowers
Owoce	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all, provided well-permeable and not too moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, iglak wysokopienny, iglak soliterowy
Pochodzenie	Lalande, Nantes, France, 1885

Gęsto rozgałęziony i pionowo rosnący cedr. Gałęzie są skierowane ku górze, więc kształt korony pozostaje wąski, piramidalny, dzięki czemu nadaje się do małych przestrzeni. Jest to główna różnica w stosunku do *C. libani* subsp. *atlantica*. Pień jest początkowo szary i gładki, ale u starszych drzew staje się bardziej szorstki. Później oddziela się małymi płatami, uwalniając czerwono-brązową korę. Rozgałęzienia są ciasno zamknięte, a gałązki są początkowo szaro-zielone do szaro-brązowych, ale w drugim roku stają się szare. Igły o długości około 2-2,5 cm są ułożone w pęczki po 20-40 sztuk. Mają efektowny szaroniebieski kolor. Pionowe szyszki pojawiają się jesienią. Młode szyszki są zielone, ale później stają się fioletowo-brązowe do brązowych. Cedr ten wymaga dużego nasłonecznienia i dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza.