



Cedrus libani 'Glaucua'



Wysokość	20 - 25 (40) m
Szerokość	12-18m
Korona	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	dark greyish black bark, scaly, young twigs have downy hair
Liście	needles, silvery blue-green, 2 - 2.5 cm, evergreen
Kwiaty	unremarkable, fragrant flowers
Owoce	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all, provided well-permeable and not too moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, iglak wysokopienny, iglak soliterowy
Pochodzenie	France, 1867
Synonimy	Cedrus atlantica 'Glaucua'

Drzewo, które we wszystkich częściach przypomina C. libani subsp. atlantica, ale wyróżnia się intensywnym niebiesko-szarym kolorem igieł. Pień jest początkowo szary i gładki, ale na starych drzewach staje się bardziej szorstki. Później rozluźnia się w małych płytkach, odsłaniając czerwono-brązową korę. Rozgałęzienia są dość luźne, ale bardziej zamknięte niż u C. libani subsp. atlantica. Wszystkie gałęzie boczne rosną w górę pod niewielkim kątem. Gałązki są początkowo szarozielone do szarobrązowych, ale w drugim roku szarzeją. Igły występują w pęczkach po 20-40 sztuk i mają długość 2-2,5 cm. Zwłaszcza na młodych pędach igły są uderzająco szaroniebieskie. Pionowe szyszki pojawiają się jesienią. Młode szyszki są zielone, ale później stają się fioletowo-brązowe do brązowych. Cedr ten wymaga dużego nasłonecznienia i dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza. Cedrus libani 'Glaucua' wyrasta na solidne drzewo, które może być używane jako soliter w dużych parkach. Drzewo to jest nadal szeroko sprzedawane pod starą nazwą C. atlantica 'Glaucua'.