



Taxodium distichum



Wysokość	18 - 30 (50) m
Szerokość	5-10m
Korona	narrow pyramidal when young, later broader, half-open crown
Kora i gałęzie	reddish brown, fibrous, grooved bark, young twigs are green
Liście	needles, soft green, spiralling around twig, 1 - 2 cm long
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	unremarkable
Owoce	ovoid cones, Ø 2 - 3 cm, first green, later brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moisture-retentive to swampy, can also be moderately dry
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, iglak wysokopienne, iglak soliterowy
Pochodzenie	south-eastern North America

Taxodium distichum (cypryśnik bagienny) to wyjątkowe liściaste drzewo iglaste, które wyróżnia się wąskim, piramidalnym kształtem w młodszych latach, a w późniejszym okresie życia osiąga imponującą szerokość od 7 do 10 metrów. Idealne do sadzenia na terenach podmokłych lub w ich pobliżu, to niezwykle drzewo rozwija charakterystyczne naziemne korzenie kolankowe, które mogą dorastać do 1 metra wysokości i 30 cm szerokości. Pień cypryśnika bagiennego charakteryzuje się włóknistą, sękatą naturą, która staje się szczególnie szeroka u podstawy i wykazuje unikalny spiralny skręt. Młode pędy i krótkopędy mają świeży zielony kolor, a krótkopędy o długości od 5 do 10 cm mają rozproszone igły. W przeciwieństwie do Metasequoia, której igły są zwrócone do siebie. Jesienią cypryśnik bagienny przyciąga uwagę pomarańczowo-brązowymi do czerwono-brązowych liśćmi, które opadają wraz z krótkopędami. Jako drzewo jednopienne, Taxodium distichum wytwarza po kwitnieniu jajowate zielone szyszki, które stają się brązowe podczas dojrzewania. Szczególną cechą tego drzewa jest jego zdolność do pozostawania w zanurzeniu przez długi czas, co czyni go idealnym wyborem do krajobrazów podmokłych i naturalnych.