



Acer x freemanii 'Armstrong'



Wysokość	10 -15 m
Szerokość	4-6m
Korona	columnar, dark, dense crown
Kora i gałęzie	no particulars
Liście	3/5 lobes, green, 10 -20 cm
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	flower corymbs, red, March/April
Owoce	none, fruitless cultivar
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	not too limy
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, wąskie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Synonimy	Acer rubrum 'Armstrong'

Odmiana Acer x freemanii 'Armstrong' powstała w 1951 roku w Stanach Zjednoczonych i do niedawna zaliczana była do gatunku A. rubrum. Ostatnie badania wykazały, że odmiana 'Armstrong' pochodzi z krzyżówki A. rubrum i A. saccharinum, a zatem należy do mieszańca Acer x freemanii. Hybryda ta nie tylko powstała w wyniku działalności człowieka, ale także występuje dziko w Stanach Zjednoczonych. Liście są trój- do pięcioklapowe i zielone. Spód jest szaro-zielony. W naszym kraju piękny pomarańczowo-czerwony kolor jesieni można zobaczyć tylko po ciepłym lecie. Jest szeroko ukorzeniona z drobnymi rozgałęzieniami. 'Armstrong' wymaga gleby niezbyt wapiennej. Drzewo dobrze radzi sobie na bruku, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania przy wąskich ulicach i alejach.