



Acer campestre



Wysokość	circa 12 m
Szerokość	7-8m
Korona	oval, dark, dense crown, capricious growing
Kora i gałęzie	grey bark with conspicuous corky fissures
Liście	3/5 lobes, dark green, 6 - 10 (12)cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	small, terminal corymbs, yellow-green, May
Owoce	single-seed winged nutlets, always paired
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any soil, except dry infertile sandy soil
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, donice na drzewa, ogrody dachowe, w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Europe, western Asia and North Africa

Acer campestre to średniej wielkości drzewo osiągające około 12 m wysokości. Ze względu na nieregularne rozgałęzienia nie tworzy symetrycznej korony. Gałęzie mają charakterystyczne paski korkowe, zarówno na starym, jak i młodym drewnie. Młode liście są czasami lekko czerwone podczas pączkowania, ale wkrótce stają się ciemnozielone. Jesienią przebarwiają się na ciemnożółty kolor, który może utrzymywać się przez długi czas. A. campestre pochodzi z Holandii i jest wykorzystywany przez ludzi od bardzo dawna. Nie tylko jako drzewo, ale także jako żywopłot, roślina ta jest bardzo funkcjonalna. Po części dzięki temu, że A. campestre toleruje cień i może rosnąć na obszarach przemysłowych, jest to roślina wszechstronna. Tworzy silnie rozgałęziony korzeń główny z bardzo dużą liczbą korzeni włośnikowych. Ponieważ roślina ta jest rozmnażana przez siew, u potomstwa mogą wystąpić pewne różnice. Przejawia się to tym, że niektóre cechy (jesienny kolor, paski korka na gałęziach) są obecne w mniejszym lub większym stopniu. Acer campestre jest również często stosowany jako roślina żywopłotowa,

ponieważ wyjątkowo dobrze znosi przycinanie. Jednak ze względu na wczesny przepływ soków, przycinanie nigdy nie powinno odbywać się wiosną.