



Acer davidii



Wysokość	8 - 12 (15) m
Szerokość	7-11m
Korona	oval to round, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	twigs purple with greyish white longitudinal stripes
Liście	oval to elongated, dark green, 8 - 16 cm
Kolor jesienny	żółty, Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	pendent corymb-shaped racemes, light yellow, May
Owoce	single-seeded, single-winged, light green
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all soils
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Central China

Acer davidii, podobnie jak A. capillipes i A. rufrum, ze swoją efektownie prążkowaną korą należy do tak zwanych "klonów węzowej skóry". Młode gałązki są ciemnofioletowo-czerwone i zachowują ten kolor nawet zimą. Starsze gałązki i pień mają charakterystyczne szaro-białe podłużne paski. Liście są mniej wyraźnie klapowane i, w przeciwieństwie do A. capillipes, owłosione od spodu wzdłuż żyłek. U młodych roślin liście są trójkłapowe, u starszych drzew bezklapowe. Kwiaty są jednopłciowe, na jednej roślinie występują kwiaty męskie i żeńskie. Roślina ma silnie rozgałęziony i zwarty system korzeniowy. Ponieważ roślina jest mniej odpowiednia do sadzenia na chodnikach, jej zastosowanie ogranicza się do sadzenia jako soliter w parkach i większych ogrodach. To drzewo ozdobne dobrze radzi sobie również w pasach zieleni.