



Acer pseudoplatanus 'Worley'



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	8-9m
Korona	wide egg-shaped, irregular, dark, dense crown
Kora i gałęzie	bark grey, branches grey to olive-green
Liście	5 lobes, golden yellow to yellow-green, 12 - 20 cm
Kwiaty	yellow-green, in pendent racemes, April
Owoce	winged nutlets (samara), 3 - 3.5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	any soil
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewa miododajne dla pszczoł
Zastosowanie	w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Willkomm, Germany, 1879
Synonimy	Acer p. var. worleei

Acer pseudoplatanus 'Worley' to średniej wielkości drzewo, które może dorastać do około 15 metrów wysokości. Drzewo ma nieregularny kształt korony. Liście rozwijają się w kolorze złotożółtym, a następnie zmieniają kolor na delikatny żółto-zielony do zielonego. Liść ma wyraźny, czerwony ogonek. Brzeg liścia jest mocniej ząbkowany niż u gatunku. Jasno zabarwione liście są nieco podatne na oparzenia słoneczne, szczególnie wiosną. Kwiaty pojawiają się podczas rozwoju liści. Odmiana 'Worley' jest stosowana jako drzewo parkowe. Jest to jedna z lepszych odmian o żółtych liściach i lepszym kolorze liści niż A. p. 'Corstorphinense'. Często nazwa jest błędnie zapisywana jako 'Worlei' lub 'Worleei'. Głęboko się ukorzenia. Toleruje wilgotne i zimne gleby, ale nie może stać w wodzie przez długi czas. Podobnie jak gatunek, ma niewielkie wymagania glebowe. Drzewo nie jest wrażliwe na wiatr.