



Acer rubrum RED SUNSET ('Franksred')



Wysokość	15 - 18 m
Szerokość	10-12m
Korona	pyramidal to ovoid, dark, dense crown
Kora i gałęzie	twigs reddish brown, bark grey
Liście	palmate, lobed, glossy bright green, leaf stem red, about 12 cm, autumn colour orange to dark red
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	red, in small umbels, March/April
Owoce	winged nut, (samara), about 2 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist, not calcareous
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	poor to moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Pochodzenie	J. Frank Schmidt, Boring, OR, USA, 1966
Synonimy	Acer rubrum 'Red Sunset'

Acer rubrum RED SUNSET ('Franksred') to średniej wielkości drzewo o równomiernie rozgałęzionej, piramidalnej do jajowatej koronie i dobrze rozłożystym wierzchołku. Gęsta, zamknięta korona. Wysokość od 15 do 18 m, szerokość około 12 m. Młode gałązki są czerwono-brązowe z przetchlinkami. Ogonek liściowy błyszczących i jasnozielonych, do 12 cm dużych liści jest również czerwony. Liść jest nieco grubszy i większy niż u gatunku. Spód jest niebiesko-zielony. Czerwone kwiaty pojawiają się przed pojawieniem się liści. Jesienne zabarwienie intensywnie pomarańczowe do ciemnoczerwonego. Liście pozostają na drzewie przez długi czas. Drzewo ma ciężki korzeń główny z drobnymi rozgałęzieniami. Na glebach wapiennych i suchych następuje zahamowanie wzrostu i brak jesiennego wybarwienia. Słabo toleruje wiatr (morski). Wrażliwy na sól drogową. Strefa mrozoodporności: 4