



Acer saccharinum 'Asplenifolium'



Wysokość	20 m
Szerokość	14-16m
Korona	round to fan-shaped, half-open crown
Kora i gałęzie	grey and smooth
Liście	palmate, lobes deeply dissected, bright green, 8 - 14 cm, autumn colour yellow
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	green-yellow, inconspicuous, March
Owoce	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	moderate to poor
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	De Bie van Aalst, Zundert, Netherlands, 1925

Acer saccharinum 'Asplenifolium' to duże drzewo o szerokiej, wachlarzowatej lub okrągłej koronie. Wyprostowane, luźne gałęzie zwisają szeroko. Wysokość i szerokość około 20 m. Rozłożyste liście są brązowe. Latem są jasnozielone z szaro-białym spodem. Są 5-kłapowe i głęboko wcięte. Średnica od 8 do 14 cm. Kłapy liści są mniej rozłożyste i mniej głęboko wcięte niż u odmiany 'Laciniatum Wieri'. 'Laciniatum Wieri'. Jesienią przebarwia się na żółto. Kwiat pojawia się przed liśćmi. Korzenie płytkie i silnie rozgałęzione z drobnymi korzeniami bocznymi. Główne korzenie mogą wypychać chodniki. Toleruje wilgotną glebę. Często używany jako drzewo uliczne, ale ze względu na łamanie gałęzi przez wiatr, obecnie sadzony raczej jako drzewo parkowe. Strefa mrozoodporności: 4