



Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'



Wysokość	20 m, fast growing
Szerokość	14-16m
Korona	round to broad fan-shaped, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	grey and smooth
Liście	palmate, lobes very deeply dissected, bright green, 8 - 15 cm, autumn colour yellow
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	green-yellow, inconspicuous, March
Owoce	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	moderate to poor
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczoł
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Ellwanger & Barry Nursery, Rochester, NY, USA, 1875
Synonimy	Acer saccharinum var. wieri

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' to drzewo o wyprostowanych, luźnych gałęziach, które z czasem zaczynają szeroko zwisać, tworząc szeroką, wachlarzowatą koronę. Wysokość i szerokość ok. 20 m. Liście klapowane, brązowe. Latem zielone z szaro-białym spodem, który jest jaśniejszy niż u gatunku. Liście są głęboko wcięte i różnią się wielkością. Odmiana 'Laciniatum Wieri' jest lepiej znana niż odmiana 'Asplenifolium' i różni się bardziej rozłożystymi liśćmi i głębiej wciętymi klapami. Jesienią przebarwia się na żółto. Płytko korzeniąca się z silnie rozgałęzionymi korzeniami i wieloma drobnymi korzeniami bocznymi. Ma tendencję do wypychania bruku. Toleruje wilgotną glebę. Często stosowany jako drzewo uliczne, ale ze względu na łamanie gałęzi przez wiatr, obecnie sadzony raczej jako drzewo parkowe. Strefa

mrozoodporności: 4