



Acer saccharinum 'Pyramidale'



Wysokość	20 m, fast growing
Szerokość	8-12m
Korona	initially columnar, later oval to round, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey and smooth
Liście	palmate, 5 lobes, dark green, 10 - 15 cm, autumn colour yellow
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	green-yellow, inconspicuous, March
Owoce	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Baumschule L. Späth, Berlin, Germany, 1885
Synonimy	Acer saccharinum var. fastigiatum

Acer saccharinum 'Pyramidale' to duże drzewo o szerokim, kolumnowym pokroju we wczesnych latach. Później staje się bardziej owalny do okrągłego. Podstawę korony tworzy kilka ciężkich, wznoszących się gałęzi. Wysokość ok. 20 m, szerokość ok. 12 m. Liście 5-klapowe, ciemnozielone z szaro-białym spodem. Wiosną przebarwiają się na niebiesko-czerwono. Kształt liści jest regularny i bardzo głęboko wcięty. Jesienią przebarwia się na żółto. Zielonkawo-żółte grona kwiatowe pojawiają się przed rozwojem liści. Płytko korzeniująca się z silnie rozgałęzionymi korzeniami i drobnymi korzeniami bocznymi. Ma tendencję do wypychania bruku. Toleruje wilgotną glebę. Odmiana 'Pyramidal' jest mniej podatna na łamanie gałęzi niż gatunek. Strefa mrozoodporności: 4