




Acer tataricum subsp. ginnala



Wysokość	5 - 7 (10) m
Szerokość	5-7m
Korona	fan-shaped, half-open crown
Kora i gałęzie	trunk grey, slightly grooved: young twigs red-brown
Liście	3-lobed, bright green, 4 - 8 cm
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	cream-white, terminal corymbs, May/June
Owoce	winged, almost parallel, circa 2.5 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	3 (-40,0 do -24,5 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi, drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	donice na drzewa, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Central and North China, Japan, Manchuria
Synonimy	Acer ginnala

Acer tataricum subsp. ginnala zwykle wyrasta na małe, wielopniowe drzewo. Jego rozłożysty pokrój gałęzi ostatecznie tworzy ładne samotne drzewo. Pomimo dość powolnego wzrostu, klon ten może osiągnąć wysokość i szerokość ponad 10 m, gdy jest w pełni dojrzały. W jego naturalnych obszarach wzrostu w Azji i Rosji występują nawet większe okazy. Młode i smukłe gałązki, które otrzymują wystarczającą ilość światła słonecznego, stają się czerwono-brązowe. Starsze gałęzie mają szary kolor. Na trójkłapowych liściach środkowy płat jest wąski i długi. Ważnym walorem ozdobnym jest jesienne wybarwienie błyszczących, ciemnozielonych liści w wielu odcieniach czerwieni do pomarańczowego. Na stanowisku słonecznym często prezentuje się lepiej. Drobnny wzrost korzeni jest płaski i płytki. Roślina bardzo odporna na zanieczyszczenia

powietrza, suszę i sól drogową.