




Catalpa ~~x~~erubescens 'Purpurea'



Wysokość	10 - 12 (15) m
Szerokość	6-10m
Korona	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown
Kora i gałęzie	grey, shallow fissured
Liście	heart-shaped, purplish-red, later dark green, 13 - 18 cm
Kwiaty	white, in large erect panicles, July/August (September)
Owoce	thin capsules, to 35 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, not in wet soils
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	moderate to poor
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	A. Waterer, England, before 1886

Średniej wielkości drzewo o półotwartej koronie, która początkowo jest piramidalna, ale później staje się jajowata do okrągłej. Twarde drewno gałązek jest kruche. Spiczaste i całkowicie gładkie liście pojawiają się późną wiosną i są ciemnofioletowo-czerwone do prawie czarnych. Młode gałązki są również ciemne. Latem liście stają się ciemnozielone; są nieco mniejsze niż u *C. erubescens* i opadają stosunkowo wcześniej. Białe, dzwonkowate kwiaty są mniejsze niż u *C. bignonioides* i występują w wyprostowanych wiechach o długości 25-35 cm. Wewnątrz kwiaty są żółte z małymi brązowymi kropkami. Po nich pojawiają się długie owoce w kształcie strąków o grubości nie większej niż 1 cm. Pozostają one na drzewie przez zimę.