



Cornus kousa



Wysokość	4 - 8 m
Szerokość	4-8m
Korona	wide vase-shaped to round, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	grey, later slightly flaking
Liście	ovate to oval, dark green, 5 - 9 cm
Kolor jesienny	żółty, Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	green yellow in heads, bracts white, May/June
Owoce	strawberry-like, compound-grown stone fruit, red
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	well-drained soils
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, małe ogrody, ogrody na patio
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Japan, Korea and central China
Synonimy	Benthamia japonica

Wielopniowe drzewo wyrastające z krzewów. Występuje w lasach górskich w Chinach, Japonii i Korei. Szerokość korony ok. 4-5 m. Wzrost powolny, szczególnie w późniejszym okresie życia. Liście są ciemnozielone i lekko faliste. Spód jest niebieskozielony i lekko owłosiony, a jesienią przebarwia się na odcienie żółci i szkarłatu. Każda główka niepozornych kwiatów jest otoczona przez 4 przylistki (przylistki) o wielkości około 8 cm, które są kremowobiałe do jasnobiałych. W pełnym rozkwicie jest szczególnie dekoracyjna. Czerwone owoce przypominające truskawki mają około 2 cm średnicy i znajdują się na czerwonych szypułkach o długości około 4 cm. Roślina ukorzenia się powierzchownie za pomocą cienkiego systemu korzeniowego. Wymaga gleby bogatej w próchnicę. Toleruje większą suszę i jest nieco bardziej odporna niż C. florida. W uprawie znajduje się kilka dobrych odmian, w większości wyselekcjonowanych z odmiany chinensis.