



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Wysokość	15 - 20 m
Szerokość	8-12m
Korona	wide ovoid to round, half-open crown
Kora i gałęzie	at a mature age deeply furrowed
Liście	odd-pinnate, 9 - 13 leaflets, deep green, 15 - 25 cm, feathered leaf
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony, purpurowy
Kwiaty	inconspicuous yellow green, in small panicles, April
Owoce	none, fruitless cultivar
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	not too rich in connection with growth rate
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże, Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	poor in the case of a rapid growth
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Australia, 1920
Synonimy	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Zdrowa, ale niezbyt silnie rosnąca odmiana o nieco nieregularnym kształcie korony. Odmiany F. angustifolia 'Flame' i 'Wollastonii' są identyczne z odmianą 'Raywood' i dlatego można je uznać za synonimy. Główna gałąź rośnie prosto, a gałęzie pnia są nachylone. Kora jest szara i głęboko rowkowana w późniejszym okresie życia, gałązki zmieniają kolor z oliwkowozielonego na szarozielony. 'Raywood' ma zamkniętą koronę jako młode drzewo, starsze drzewa stają się półotwarte. Błyszczące, ciemnozielone liście składają się z 9-13 wąskich listków. Mają one około 5-10 cm długości. Jesienią liście przebarwiają się od pomarańczowo-żółtego do głęboko purpurowo-czerwonego. Na cieplejszych glebach i podczas ciepłej jesieni kolor jesieni jest bardziej intensywny. Po niepozornym kwitnieniu nie następuje owocowanie. Na glebach żyznych wzrost jest często szybszy niż na glebach ubogich. Może to prowadzić do łamania się gałęzi.