



Quercus x kewensis



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	5-10m
Korona	broad oval to round, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs light brown, hairy, bark first grey and smooth, later almost black and grooved
Liście	oval to oval-elongated, shallow lobed, matt dark green, 5 - 8 cm
Kwiaty	♂ catkins, May
Owoce	approx. 2.5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7b (-14,9 do -12,3 °C)
Odporność na wiatr	fairly, cannot tolerate cold, drying wind
Odporność na inne	odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Royal Botanic Gardens, Kew, London, England, 1914

Średniej wielkości lub duże drzewo o szerokiej, owalnej, ewentualnie okrągłej koronie. Młode gałązki są jasnobrązowe i wysadzone krótkimi włoskami. Starsza kora jest początkowo szara i gładka, ale później prawie czarna i rowkowana. Liście są owalne do owalno-lancetowatych i mają od 5 do 8 cm długości. Brzeg liścia jest płytko klapowany z 5 do 6 zaokrąglonymi trójkątnymi klapami. Liście są matowe, ciemnozielone z wierzchu i błyszczące, jaśniejsze od spodu. Żołędzie osiągną wielkość około 2,5 cm i dojrzewają w ciągu dwóch lat. Zazwyczaj jednak żołędzie spadają z drzewa zanim dojrzeją. Ten gatunek mieszańca Q. wizlizenii i Q. cerris został znaleziony przypadkowo w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Kew w 1914 roku. Odnosi się do tego nazwa gatunku kewensis. To drzewo parkowe wymaga osłoniętego stanowiska i nie toleruje zimnych, wysuszających wiatrów.