



Salix cinerea



Wysokość	3 - 6 (8) m
Szerokość	3-6m
Korona	round, dark, dense crown
Kora i gałęzie	twigs grey-green, bark grey-brown, later shallow grooved
Liście	elliptical to reverse lanceolate, matt green, 5 - 10 cm
Kwiaty	♂ catkins greenish-yellow, 5 cm, ♀ catkins light brown, April
Owoce	catkins, approx. 8 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, tolerates wet to marshy soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	3 (-40,0 do -24,5 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe
Pochodzenie	Europe, Eastern to Central Asia

Mocny krzew do małego drzewa o kulistej koronie, zwykle nie wyższy niż około 5 m. Młode gałązki są szaro-zielone i szaro-filcowate w pierwszych dwóch latach. Starsza kora jest szarobrazowa i gładka, z płytkimi podłużnymi rowkami w późniejszym okresie życia. Liście są eliptyczne do odwrotnie lancetowatych. Górna powierzchnia jest lekko matowozielona i bardzo krótko owłosiona. Spód jest gęsto szaro-filcowany. Półsercowate liście podporowe pozostają u podstawy liścia przez cały sezon. Kotki dojrzewają w kwietniu. Kotki męskie mają około 5 cm długości i są zielonkawożółte. Kotki żeńskie są jasnobrązowe i mają około 8 cm długości w fazie owocowania. Rośnie praktycznie na każdej glebie, nawet bardzo ubogiej. Nie toleruje suszy, ale toleruje gleby wilgotne i podmokłe. To sprawia, że drzewo nadaje się do nasadzeń nadbrzeżnych.