



Sorbus ×arnoldiana 'Schouten'



Wysokość	8 - 10 m
Szerokość	3-5m
Korona	ovoid, half-open crown
Kora i gałęzie	grey, smooth, later a little flaky
Liście	imparipinnate, approx. 20 cm long, 9 - 17 (21) leaflets, dark green, feathered leaf
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	in umbels, Ø approx. 15 cm, white flowers, May/June
Owoce	orange-yellow, in wide umbels, August/September
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	preferably slightly acid humic soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Brouwers Boomkwekerijen B.V., Groenekan, The Netherlands, circa 1950

Drzewo to tworzy dość gęstą, jajowatą koronę, która później staje się bardziej zaokrąglona. Nieparzysto pierzaste liście składają się z 9-17 (21) lancetowatych listków. Mają one długość od 5 do 7 cm, szerokość od 2 do 3 cm i drobno ząbkowany brzeg. Jesienią przebarwiają się na pomarańczowo-czerwono. Duże, filcowe kwiatostany składają się z wielu białych kwiatów. Pomarańczowo-żółte owoce o średnicy około 1 cm pojawiają się już w sierpniu i pozostają na drzewie do około połowy września. Owocowanie jest mniej liczne niż u innych odmian. Odmiana 'Schouten' preferuje gleby lekko kwaśne, bogate w próchnicę, ale dobrze rośnie również na suchych glebach piaszczystych. Drzewo zostało znalezione w partii sadzonek S. discolor około 1950 roku. Później stwierdzono, że 'Schouten' należy do mieszańca S. x arnoldiana.