



Sorbus discolor



Wysokość	6 - 8 m
Szerokość	3-5m
Korona	broad ovoid, half-open crown
Kora i gałęzie	grey, twigs bare and glossy reddish-brown
Liście	imparipinnate, approx. 18 cm, 11 - 17 leaf segments, dark green, feathered leaf
Kolor jesienny	czerwony
Kwiaty	white, in umbels of approx. 12 cm Ø, May
Owoce	almost white to creamy yellow, turning pink, Ø 0.7 - 1 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	makes few demands, stands up to poor dry soils
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Northern China
Synonimy	Sorbus pekinensis discolor

To małe drzewo ma otwartą koronę z mocnymi, wyprostowanymi gałęziami. Nie tworzy gałęzi sercowatych, przez co kształt korony jest szeroko jajowaty. Młode gałązki są nagie i błyszczące, czerwono-brązowe. Nieparzysto pierzaste liście składają się z 11-17 listków, które są lancetowate do podługnych, a liście podporowe są długie. Brzeg liścia jest ząbkowany, z wyjątkiem podstawy liścia, gdzie jest cały. S. discolor ma ciemnozielone liście, które pod spodem są niebiesko-zielone. Jesienią przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor. Kwiatostan składa się z luźno rozgałęzionych baldachów, które są lekko owłosione i zawierają wiele białych kwiatów. Późnym latem pojawiają się owoce. Są one prawie białe do kremowo-żółtych, a czasami mają jasnorożowy odcień. Ze względu na swój jasny kolor owoce ładnie kontrastują z jesiennymi kolorami drzewa. Gatunek godny polecenia.