



Quercus cerris 'Summer Veil'



Wysokość	5 - 6 m
Szerokość	3-4m
Korona	broad pyramidal, semi-open crown
Kora i gałęzie	twigs grey-brown to grey-green, felt-like, bark almost black, roughly grooved
Liście	Elongated to oval, lobes very deeply incised, green, 6 - 12cm
Kwiaty	long ovoid, 2.5 - 3 cm, 1 - 4 together, cupule with long, narrow recurved scales
Owoce	Tree nursery M.M. Bömer, Zundert, Netherlands, 1995
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	preferably calcareous
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Middelgrote boom met een ietwat onregelmatige breed kegelvormige tot ronde kroon. Groeit beduidend langzamer dan de soort en blijft uiteindelijk kleiner. De stam heeft minder diktegroei en de twijgen zijn relatief dun. Het meest opvallende kenmerk van 'Summer Veil' zijn de zeer diep gelobde bladeren. De bladeren zijn op veel plaatsen tot op de hoofdnerf gelobt. De puntige lobben zijn op hun beurt ook grof getand. De bladern zijn 's zomers groen, kleuren geelbruin in de herfst en blijven tot diep in de winter verdroogd in de boom hangen. Gevoelig voor bastscheuren bij vorst. De diep gelobde bladeren geven de boom een fraaie, fijne textuur. Deze cultivar ontstond als zaailing van Q. cerris en werd door Van den Berk Boomkwekerijen, Sint-Oedenrode, Nederland op de markt gebracht.

Średniej wielkości drzewo o nieco nieregularnej, szeroko stożkowatej lub zaokrąglonej koronie. Rośnie znacznie wolniej niż gatunek i ostatecznie pozostaje mniejsze. Pień ma mniejszą grubość, a gałązki są stosunkowo cienkie. Najbardziej uderzającą cechą 'Summer Veil' są bardzo głęboko klapowane liście. W wielu miejscach liście są klapowane do głównej żyły. Z kolei spiczaste kłapy są również grubo ząbkowane. Latem liście są zielone, jesienią stają się żółtobrazowe i pozostają na drzewie do późnej zimy, kiedy to zasychają. Podatna na pękanie kory podczas mrozów. Głęboko klapowane liście nadają drzewu atrakcyjną, delikatną teksturę. Odmiana ta powstała jako siewka Q. cerris i została

wprowadzona na rynek przez Van den Berk Nurseries, Sint-Oedenrode, Holandia.