



Cedrus libani subsp. atlantica



Wysokość	20 - 25 (40) m
Szerokość	10-15m
Korona	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
Liście	needles, light green to silvery blue, 2 - 2.5 cm, evergreen
Kwiaty	unremarkable, fragrant flowers
Owoce	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all, provided well-permeable and not too moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, iglak wysokopienny, iglak soliterowy
Pochodzenie	Atlas mountains (north-eastern Algeria and northern Morocco)
Synonimy	Cedrus atlantica

Ten geograficzny podgatunek Cedrus libani jest szybko rosnącym dużym drzewem z poziomymi gałęziami w późniejszym okresie życia. Naturalnie rośnie na suchych, wapiennych zboczach górskich w górach Atlas w północno-zachodniej Afryce. Pień jest początkowo szary i gładki, ale na starych drzewach staje się bardziej szorstki. Później oddziela się małymi płytkami, uwalniając czerwonawo-brązową korę. Rozgałęzienia są dość luźne i otwarte, a gałązki są początkowo szaro-zielone do szaro-brązowych, ale stają się szare w drugim roku. Igły są ułożone w pęczki po 20-40 sztuk i mają długość 2-2,5 cm. Pionowe szyszki pojawiają się jesienią. Młode szyszki są zielone, ale później stają się fioletowo-brązowe do brązowych. Cedr ten wymaga dużego nasłonecznienia i dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza.