




Larix kaempferi



Wysokość	25 - 30 m, fast growing
Szerokość	15-20m
Korona	broad conical, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	red to grey, thick, scaled bark, flakes off
Liście	needles in bundles of up to 50, bluish to dark green, 2 - 3.5 cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	unremarkable, ovoid $\varnothing$ 1 -1.5 cm reddish brown, $\varnothing$ 0.5 - 1 cm yellowish, April
Owoce	oval to round cones, 2 - 3 cm, yellowish brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all, apart from acidic soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good, also tolerates sea wind
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Zastosowanie	w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, drzewo wielopniowem, iglak wysokopienny, iglak soliterowy
Pochodzenie	Japan
Synonimy	Larix leptolepis

Liściaste drzewo iglaste o spiczastej, szeroko stożkowatej i bardzo otwartej koronie, poziomo rozgałęzionej. Dolne gałęzie często lekko zwisają. Szerokość około 10 - 15 m. Młode okazy rosną bardzo szybko, później prędkość ta maleje. Kora jest czerwona do szaro-brązowej, gruba i łuszcząca się wąskimi paskami. Gałązki są zwykle czerwono-brązowe i lekko owłosione, czasem oszronione. Pąki znajdują się na krótkich pędach, a miękkie igły występują w wiązkach po 40-50 sztuk. Są one niebieskozielone do ciemnozielonych po obu stronach i zmieniają kolor na złotożółty późną jesienią. Pomimo japońskiego pochodzenia, gatunek ten jest szerzej stosowany w Europie niż modrzew europejski. Drzewo to jest również wykorzystywane do kształtowania krajobrazu i dobrze sprawdza się jako roślina żywopłotowa.