



Taxodium distichum 'Cascade Falls'



Wysokość	2.5 - 4 m
Szerokość	3-4m
Korona	broad, weeping, dark, dense crown
Kora i gałęzie	twigs yellow-green to reddish brown, bark reddish brown, fibrous, grooved
Liście	needles, spirally arranged around twig, 1 - 2 cm, green
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	inconspicuous
Owoce	ovoid cones, Ø 2 - 3 cm, first green, later brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist to swampy, may also be moderately dry
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe, małe ogrody
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, iglak wysokopieny, iglak soliterowy
Pochodzenie	Noeline & David Sampson, Cedar Lodge Nursery, New Plymouth, New Zealand, 1999

Liściaste drzewo iglaste o szerokiej, płaczącej koronie. Z natury drzewo to nie wytwarza gałęzi sercowych, a wszystkie gałązki zwisają w dół. Ostateczna wysokość jest zatem w dużym stopniu zależna od wysokości szczepu. Ponieważ gatunek ten jest używany jako podkładka, kora jest podobna do kory T. distichum; czerwono-brązowa i włókniście rowkowana. W późniejszym okresie życia pień skręca się. Gałązki są początkowo żółto-zielone, a po zdrewnieniu czerwono-brązowe. Ciemnozielone igły są rozrzucone na krótkich pędach. Jesienią igły stają się pomarańczowo-brązowe do czerwono-brązowych. Opadają w tym samym czasie, co krótkie pędy. Ze względu na brak gałęzi sercowej nie nadaje się na aleję lub drzewo uliczne, ale dzięki pięknej szerokiej płaczącej koronie drzewo jest bardzo atrakcyjne w parkach i ogrodach. Preferuje gleby wilgotne do mokrych, ale toleruje również gleby umiarkowanie suche.