




Taxodium distichum var. imbricatum



Wysokość	12-15 m
Szerokość	5-7m
Korona	narrow conical, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs green to reddish brown, bark reddish brown, fibrous grooved
Liście	green
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	inconspicuous, flowers in March
Owoce	green, brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	loamy soil, sandy soil, peaty soil, acid soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, iglak wysokopieny, iglak soliterowy

Taxodium distichum var. imbricatum to liściaste drzewo iglaste o szerokim kolumnowym pokroju, później wąsko piramidalnym. Zazwyczaj dorasta do 12-15 m wysokości. Pień zwykle zwęża się ku wierzchołkowi drzewa. Młode gałązki są czerwono-brązowe, starsza kora jest szaro-czerwono-brązowa i nieco mniej włókniście łuszcząca się niż u gatunku T. distichum. Główne gałęzie są mniej więcej poziome w stosunku do pnia, ale gałęzie boczne rosną w górę prawie równolegle do pnia. Igły są bardzo małe, mają tylko 4-6 mm długości i są mniej lub bardziej docięnięte do krótkopędów i długopędów. Igły i krótkie pędy opadają jednocześnie jesienią. Liście są jasnozielone, a latem stają się średnio zielone. Jesienią przebarwiają się na pomarańczowo-brązowy kolor. Typowe rozgałęzienie i delikatna struktura liści nadają tej odmianie efektowny wygląd. Taxodium distichum var. imbricatum toleruje gleby wilgotne do podmokłych i może być uprawiany na glebach półwężłych. W przeciwieństwie do gatunku, odmiana ta rzadko tworzy charakterystyczne korzenie kolankowe. Odmiana o drobnej teksturze do stosowania w ogrodach, parkach, obszarach przemysłowych i na cmentarzach. Występuje na niższych obszarach przybrzeżnych od Wirginii po Luizjanę w USA.

