



Taxus baccata



Wysokość	10 - 15 (20) m
Szerokość	8-12m
Korona	ovoid to round, irregular, dark, dense crown
Kora i gałęzie	bark thin and brownish red, flaking, deep grooves
Liście	needles, deep dark green, 1.5 - 3 cm, evergreen
Kwiaty	unremarkable, dioecious, ♂yellow buds, ♀green
Owoce	brownish black seeds, covered 4/5 with a fleshy, red case
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	well-permeable
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe, ogrody na patio
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem, iglak wysokopienny, iglak soliterowy, krzew soliterowy
Pochodzenie	Europe, North Africa, Western Asia, Caucasus

Zwykle pokaźny krzew, który wyrasta na małe drzewo. Wzrost jest powolny, ale ostatecznie drzewo może osiągnąć wysokość około 15-20 m przy szerokości około 12-15 m. Kształt korony jest nieregularny. Krótki, brązowo-czerwony pień z wiekiem staje się gruby, a następnie łuszczy się. Stare gałęzie znacznie zwisają i czasami dotykają ziemi. Młode gałązki są zielone. Igły są naprzeciwległe na gałązkach rosnących poziomo i spiralne na gałązkach rosnących pionowo. Po nietypowym kwitnieniu pojawiają się wyraźne owoce. Około 4/5 nasion otoczonych jest owalną, mięsistą, czerwoną otoczką o długości 0,6 - 0,7 cm. Chociaż czerwona mięsista część owocu nie jest trująca, nasiona, podobnie jak igły, są trujące. Roślina doskonale nadaje się do przycinania w żywopłoty i inne formy.