




Taxus cuspidata



Wysokość	2.5 - 5 m
Szerokość	3-5m
Korona	spherical, irregular, later broader, dark, dense crown
Kora i gałęzie	reddish brown, flaking bark, twigs green
Liście	needles, deep dark green, 1.5 - 3 cm, evergreen
Kwiaty	unremarkable, dioecious, ♂ yellow buds, ♀ green
Owoce	brownish black seeds, covered 4/5 with a fleshy, red case
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	sandy, loamy soil, well-permeable
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe, małe ogrody, ogrody na patio
Shape	iglak soliterowy
Pochodzenie	Eastern Asia

Wolno rosnący, gęsto rozgałęziony krzew, który może wyrosnąć na wielopniowe, nieregularne drzewo. W swoim naturalnym zasięgu dorasta do 15-20 m wysokości, ale w uprawie nie przekracza około 5 m. Pień jest czerwono-brązowy i łuszczący się. Gałęzie rosną rozłożyste i lekko wyprostowane i są gęsto pokryte krótkimi gałęziami bocznymi. Bardzo ciemnozielone igły mają kształt linii i są ostro zakończone. Od spodu są jaśniejsze, a krótka łodyga jest żółtawa. Po nie wyróżniającym się kwitnieniu następują nasiona, z których 4/5 jest otoczonych mięsistą czerwoną osłonką o długości około 0,5 cm. Ze względu na lepszą odporność niż *T. baccata*, gatunek ten jest powszechnie uprawiany w USA i Kanadzie. W Europie *T. cuspidata* jest głównie wykorzystywana do przycinania (bonsai) ze względu na swój wielopniowy wzrost.