




## Taxus cuspidata f. nana



|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość</b>                     | 1-2 m                                                                                         |
| <b>Szerokość</b>                    | 1-4m                                                                                          |
| <b>Korona</b>                       | flatened spherical, dark, dense crown                                                         |
| <b>Kora i gałęzie</b>               | reddish brown bark, peeling, twigs green                                                      |
| <b>Liście</b>                       | green, evergreen                                                                              |
| <b>Kwiaty</b>                       | yellow, green, flowers in March                                                               |
| <b>Owoce</b>                        | brown-black seeds, 4/5 covered by fleshy, red case                                            |
| <b>Kolce/ciernie</b>                | None                                                                                          |
| <b>Toksyczność</b>                  | Zawiera substancje toksyczne.                                                                 |
| <b>Rodzaj gleby</b>                 | clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil, calcareous soil                               |
| <b>Wymagania stanowiskowe</b>       | Nie toleruje utwardzonej nawierzchni                                                          |
| <b>odporność na mróz</b>            | 6b (-20,5 do -17,8 °C)                                                                        |
| <b>Odporność na wiatr</b>           | good                                                                                          |
| <b>Odporność na inne</b>            | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr                                |
| <b>Drzewo wybierane przez faunę</b> | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewa miododajne dla pszczół |
| <b>Zastosowanie</b>                 | donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe, małe ogrody, ogrody na patio            |
| <b>Shape</b>                        | iglak soliterowy                                                                              |

Taxus cuspidata f. nana to wiecznie zielone drzewo iglaste o szerokim, wyprostowanym lub kulistym pokroju. Osiąga 1-2 m wysokości i taką samą szerokość. Taxus cuspidata f. nana ma gęste rozgałęzienia z lekko falistymi gałęziami. Młode gałęzie brązowe, stara kora ciemniejsza, czerwono-brązowa. Igły mają około 2 cm długości i są matowe, od średnio do ciemnozielonych. T. cuspidata różni się od T. baccata (między innymi) tym, że łuski pąków są lancetowate (jajowate u T. baccata), a końce igieł są spiczaste (spiczaste u T. baccata). W obiegu znajduje się kilka klonów f. nana, dlatego też nazwa ta nie ma statusu kultywaru. Klony te mogą być męskie lub żeńskie. Klony żeńskie mogą produkować owoce. Ciemnobrązowe nasiona są w dużej mierze otoczone mięsistym, czerwonym miąższem. Miąższ nie jest trujący, ale nasiona tak. Igły są również trujące. Dobra roślina do stosowania na rabatach, ale również bardzo dobrze nadaje się do topiary. Toleruje cień, dlatego może być stosowana również pod standardowymi drzewami. Doskonała mrozoodporność przyczynia się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym w ogrodach, parkach, na nasypach, terenach przemysłowych i cmentarzach.

Strefa mrozoodporności: 6b