




Acer xzoeschense 'Annae'



Wysokość	8 - 10 m
Szerokość	6-8m
Korona	round, spherical, half-open crown
Kora i gałęzie	bark grey-brown, young twigs red
Liście	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	yellow-green corymbs, May
Owoce	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any soils
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Schwerin, Germany, 1908

Acer xzoeschense 'Annae' jest mieszańcem A. campestre i A. cappadocicum subsp. lobelii. Acer xzoeschense 'Annae' ma otwartą, niemal kulistą koronę. Drzewo ma regularny, piętrowy pokrój i może osiągnąć wysokość około 10 m. Młode i smukłe gałązki, które otrzymują wystarczającą ilość światła słonecznego, przybierają efektowny czerwono-brązowy kolor. Starsze gałęzie mają szarobrązowy kolor. A. zoeschense 'Annae' nie tworzy korka na gałązkach. Nieco podobne liście do A. campestre zmieniają kolor na ciemnofioletowy i powoli stają się ciemnozielone. Brzeg liścia jest bardziej pofalowany niż u A. campestre, a liście są nieco większe. Ważną wartością ozdobną jest jesienne wybarwienie błyszczących, ciemnozielonych liści w wielu odcieniach od czerwonego do pomarańczowego. Często lepiej wyglądają na stanowiskach słonecznych. Drobny wzrost korzeni jest płytki. Bardzo odporna na zanieczyszczenia powietrza i niewrażliwa na choroby i szkodniki.