



Acer cappadocicum



Wysokość	10 - 18 m
Szerokość	7-11m
Korona	wide egg-shaped, half-open crown
Kora i gałęzie	young twigs shiny green, striped
Liście	5/7 lobes, dark green, 8 - 14 cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	yellow-green corymbs, circa 6 - 7 cm, May
Owoce	single-seeded, winged, light green
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	humic moist soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	moderate to good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Middle-East (North Turkey to Iran and in the Caucasus)

Acer cappadocicum to średniej wielkości drzewo o szerokiej, mocno opasanej, pełnej koronie. Młode gałązki są błyszcząco zielone, często z jasnoszarymi paskami, które później stają się szarobrązowe. Jednak gatunek ten nie powinien być zaliczany do "klonów węzowej skóry"; paski są na to zbyt niewyraźne. Ciemnozielone liście mają niezwykle cienkie ogonki z mlecznym sokiem. Są lekko błyszczące i mają od pięciu do siedmiu wyraźnie zaokrąglonych kłap. Jesienią przebarwiają się na ciemnożółty kolor. A. cappadocicum to drzewo, które rozwija się w wilgotnej, bogatej w próchnicę glebie. Nie należy sadzić go w bardzo wietrznych miejscach.