



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	6-9m
Korona	flattened, round, wide crown, half-open crown
Kora i gałęzie	young twigs dark purple at first, later dark green
Liście	5/7 lobes, pointed, unfurling deep purple
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	yellow-green corymbs, 6 - 7 cm, May
Owoce	winged
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	humic, not too dry
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Baumschulen Booth, Germany, 1838

Acer cappadocicum 'Rubrum' jest podobny we wszystkich częściach i cechach do wcześniej opisanego 'Aureum'. Jediną różnicą jest kolor liści. Młode liście odmiany 'Rubrum' są głęboko purpurowo-czerwone, a latem stają się ciemnoczerwono-zielone. Jesienią liście stają się głęboko żółte. W przeciwieństwie do żółtolistnego 'Aureum', 'Rubrum' nie jest podatny na poparzenia liści w słonecznych okresach lata. 'Rubrum' jest doskonałym drzewem ulicznym i parkowym, ale gorzej znosi bruk niż żółtolistna odmiana 'Aureum'.