




Acer davidii subsp. grosseri



Wysokość	circa 10 m
Szerokość	6-8m
Korona	oval to round, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	twigs purple with grey-white longitudinal stripes
Liście	usually 3-lobed, oval triangular, circa 9 cm
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony
Kwiaty	pendent racemes, light yellow, May
Owoce	single-seeded, single-winged, light green
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all soils
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, małe ogrody, ogrody na patio
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Northern and Central China
Synonimy	Acer grosseri

Ten klon wężowej skóry (Acer davidii subsp. grosseri) tworzy duży wielopniowy krzew do małego drzewa o maksymalnej wysokości około 10 m. Korona jest owalna do okrągłej z wdzięcznie wygiętymi gałęziami. Gałązki są zwykle nieco bardziej zielone, a także nieco jaśniejsze niż u A. davidii. Dzięki temu paski są nieco mniej widoczne. Zwykle 3-kłapowe liście mogą być czasami prawie bezkłapowe. Brzeg liścia jest podwójnie ząbkowany. Kwiaty są jednopłciowe; kwiaty męskie i żeńskie występują na jednej roślinie. Roślina ma silnie rozgałęziony i zwarty system korzeniowy. Jak można się spodziewać po podgatunku, różni się tylko nieznacznie od gatunku A. davidii. A. davidii subsp. grosseri jest rośliną ozdobną, która dobrze nadaje się do ogrodów i wąskich uliczek.