



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Wysokość	15-20 m
Szerokość	10-12m
Korona	broad ovoid, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey
Liście	green, redbrown
Kwiaty	yellowgreen, flowers in April
Owoce	brown, inconspicuous
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	not very sensitive, not resistant to sea wind
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne

Historia Acer platanoides 'Reitenbachii' sięga szkółki J. Reitenbacha w Polsce, a następnie w Rosji. Roślina została nazwana przez Johanna Xavera Roberta Caspary'ego, niemieckiego botanika, ale to belgijska szkółka Louisa Van Houtte'a wprowadziła ją na rynek. Pod względem pokroju odmiana 'Reitenbachii' jest podobna do gatunku. Rozwijające się liście są błyszczące, ciemnobrązowe, a latem stają się matowo ciemnozielone z ciemnoczerwonymi żyłkami. Piękne drzewo nieco podobne do 'Schwedleri', którego kolory liści są bardziej intensywne. Rośnie na wszystkich glebach, ale nie toleruje stagnujących wód gruntowych i gleb torfowych.