



Cydonia oblonga 'Leskovacka'



Wysokość	3 - 5 m
Szerokość	3-5m
Korona	broad oval to almost round, dense crown, capricious growing
Kora i gałęzie	bark black-brown, young twigs have felt-like hair
Liście	green
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	white pink, flowers in May, fragrant flowers
Owoce	edible fruits, yellow
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, małe ogrody, ogrody na patio
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem, wysokopienne drzewo owocowe, półpienne drzewo owocowe

'Leskovacka' to niewielkie drzewo o szeroko-owalnej do prawie okrągłej koronie i wysokości 3-5 m. Czasami drzewo rośnie wyżej, do około 8 m. Rośnie umiarkowanie silnie, a gałęzie rosną dość stromo. Młode gałązki są filcowato owłosione, a stara kora jest czarno-brązowa. Ovalne lub jajowate liście są ciemnozielone i mają 5-8 cm wielkości. Kwitnienie przypada na okres od połowy do końca maja, znacznie później niż u większości innych gatunków C. oblonga. Kwiaty mają kolor od białego do delikatnie różowego i wielkość 4-5 cm. Jadalne owoce dojrzewają około połowy października. Są one jabłkowate, zielonkavo-żółte do żółtych i mają około 10 cm wielkości. Produktywność odmiany 'Leskovacka' jako młodego drzewa jest już regularna i dobra. Została znaleziona jako przypadkowa sadzonka w Serbii około 1880 roku. Oprócz dobrego owocowania, drzewo wyróżnia się nieco większą wytrzymałością niż inne odmiany i małą podatnością na mączniaka. Strefa mrozoodporności 5a