



Gleditsia triacanthos



tak

Wysokość	20 - 25 m, fast growing
Szerokość	10-15m
Korona	round, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	dark-grey bark with shallow fissures
Liście	pinnate or twice-pinnate, fresh green, 15 - 35 cm, feathered leaf
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	♀ in light-green clusters, ♂ in spikes, May/June
Owoce	crescent shaped pods, 30 - 45 cm
Kolce/ciernie	tak
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	light soils
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi, drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	North America

False Christthorn występuje w środkowej i środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie na wilgotnych glebach. Można go jednak znaleźć również w bardziej suchych miejscach. Luźna, otwarta korona ma nieregularnie rosnącą gałąź centralną. Pień jest szary i ma płytkie rowki. Ważny producent drewna w Ameryce. Pień i gałęzie mają ostre, rozgałęzione ciernie. Dlatego też popularną alternatywą jest bezkolcowa forma f. inermis. Duże, złożone liście wyrastają późno i jesienią przebarwiają się na złotożółty kolor. Pojedyncze liście mają wielkość około 3 cm. Po kwitnieniu pojawiają się strąki, czasami o długości do 45 cm. Są sierpowate, płaskie i zwykle nieco skręcone, początkowo żółto-zielone, później brązowo-czerwone. Dobrze utrzymuje się do zimy. Ma głębokie korzenie z wieloma rozgałęzieniami. Dobrze radzi sobie na bruku.