



Koelreuteria paniculata

'September'



Wysokość	7 - 17 m
Szerokość	7-15m
Korona	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown
Kora i gałęzie	grey-brown, slightly grooved
Liście	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
Kolor jesienny	żółty, Pomarańczowy
Kwiaty	yellow, in large terminal plumes, August/September
Owoce	bladder-shaped, bronze in colour, seeds black, Ø approx. 4.5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Indiana University, Bloomington, USA, 1960

Ta amerykańska odmiana początkowo rośnie szybciej niż gatunek. Okrągła korona staje się coraz szersza. Rozłożyste gałęzie wyginają się. Duży, pierzasty (czasami podwójnie pierzasty) liść składa się z 7-15 segmentów. Są one klapowane, mają około 7-10 cm długości i ząbkowany brzeg. Liście są brązowe wiosną i żółte do pomarańczowych jesienią. Liczne, małe, żółte kwiaty tworzą końcowe, luźne wiechy o długości około 30 cm. Kwitnienie rozpoczyna się od 6 do 8 tygodni później niż u gatunku i często jest bardzo obfite. Pęcherzykowate owoce o średnicy około 4,5 cm zmieniają kolor z zielonego na brązowy i zawierają kilka czarnych nasion. Pozostają na drzewie przez długi czas. Preferuje osłonięte stanowiska, ponieważ młode drzewa mogą być uszkodzane przez mróz, w przeciwnym razie dobrze się regenerują.