# Ostrya carpinifolia

| | |
|---|---|
| **Wysokość** | 14 - 16 (20) m |
| **Szerokość** | 8-15m |
| **Korona** | broad ovoid to rounded, dark, dense crown |
| **Kora i gałęzie** | brown-grey, grooved, branches olive-green |
| **Liście** | ovoid to oval, green, double serrated leaf edge, 5 - 10 cm |
| **Kolor jesienny** | żółty |
| **Kwiaty** | yellow-green catkins, ♂approx. 4 - 6 cm, ♀catkins shorter, April |
| **Owoce** | nutlets, in fruit resembling hops |
| **Kolce/ciernie** | None |
| **Toksyczność** | Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych. |
| **Rodzaj gleby** | likes calcareous soil |
| **Wilgotność podłoża** | Dobrze znosi suche podłoże |
| **Wymagania stanowiskowe** | Toleruje utwardzoną nawierzchnię |
| **odporność na mróz** | 5b (-26,0 do -23,4 °C) |
| **Odporność na wiatr** | good |
| **Odporność na inne** | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr |
| **Zastosowanie** | aleje i szerokie ulice |
| **Shape** | drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem |
| **Pochodzenie** | Southern Europe, Asia Minor |

Wolno rosnące drzewo o stożkowatej koronie we wczesnych latach. Później na dzielącym się pniu głównym pojawiają się szerokie gałęzie boczne, dzięki czemu korona staje się bardziej zaokrąglona. Ostatecznie może osiągnąć ponad 12 m szerokości. Krótki pień jest brązowo-szary, rowkowany i podzielony na wąskie, małe płytki. U starszych drzew pień staje się coraz ciemniejszy. Młode gałązki są nagie i oliwkowozielone. Owalne lub jajowate liście mają podwójnie ząbkowany brzeg i przebarwiają się na żółto jesienią. Ostrya kwitnie obficie żółto-zielonymi, męskimi kotkami o długości około 4-6 cm i niepozornymi kwiatami żeńskimi w małych kłosach. Po zapłodnieniu rozwijają się z nich owoce w kształcie szyszek chmielowych o długości około 6 cm. Wymaga ciepłego i osłoniętego stanowiska i rośnie na wszystkich glebach, nawet bardzo suchych.

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2025