




Quercus coccinea 'Splendens'



Wysokość	8 m
Szerokość	12-15m
Korona	flat-topped spherical, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs brown, with thorns, bark grey-brown, slightly grooved
Liście	broad oval, glossy dark green, 5 - 10 cm, autumn colour yellow, orange and red
Kolor jesienny	czerwony
Kwiaty	white, in felt-like panicles, May-June
Owoce	round, bright red, Ø about 1 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	cannot tolerate wet soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Knap Hill Nursery, Woking, England, circa 1900

Tworzy szeroką koronę z poziomo odchodzącymi gałęziami. Kora jest ciemnoszara do prawie czarnej i umiarkowanie szorstka. Q. coccinea wykazuje silne podobieństwo do Q. palustris. Młode gałązki Q. coccinea są jednak żółto-brązowe, podczas gdy gałązki Q. palustris są oliwkowozielone. Liście są podługne do owalnych (czasami odwrotnie jajowate) i pierzasto klapowane z 7 - 9 oderwanymi ząbkowanymi płatkami. Mniej głęboko wcięte niż u Q. palustris, o długości 9-15 cm i szerokości 6-11 (15) cm. Jesienią przebarwia się na głęboki szkarłat. Ta odmiana Quercus coccinea różni się od gatunku jeszcze bardziej intensywnym jesiennym zabarwieniem. Po zbrązowieniu liście pozostają na drzewie do połowy zimy. Żołędzie są pojedyncze i od 1/3 do połowy otoczone drzemką.