



Quercus robur 'Cristata'



Wysokość	6 - 10 m
Szerokość	4-8m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs reddish brown, bark dark grey, deeply grooved
Liście	variable, ovate to obovate, roughly lobed to cleft, dark green, 3 - 7 cm
Kwiaty	green-yellow catkins, 2 - 4 cm, May
Owoce	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	fertile and moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Savernake Forest, Wiltshire, England, 1917

Średniej wielkości drzewo o nieco nieregularnym, okrągłym kształcie korony i ciekawie ukształtowanych liściach. Drzewo osiąga od 6 do 10 m wysokości i szerokości, rośnie wolniej niż gatunek i dlatego pozostaje mniejsze. Liście o długości od 3 do 7 cm są stosunkowo małe i jajowate lub odwrotnie jajowate. Są gęsto skupione na końcach gałązek i bardzo zmienne. Wiele liści jest podzielonych wzdłuż głównej żyły do ogonka na dwie nierówne części. Inne liście są podzielone na trzy lub więcej mniejszych "listków". Brzegi liści są grubo klapowane z zaokrąglonymi kłapami. W trakcie tego procesu liście są skręcone i wypukłe. Drzewo zostało znalezione w lesie w Wiltshire w Anglii na początku XX wieku i opisane w 1917 roku. Sadzonka oryginalnego drzewa została następnie wprowadzona do obrotu jako "Cristata". Jest to typowe drzewo parkowe. Prawdopodobnie nadaje się również do stosowania w szerokich alejach.