



Quercus robur 'Timuki'



Wysokość	15 - 20 m
Szerokość	8-12m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs dark brown, bark dark grey, deeply grooved
Liście	obovate, lobed, dark greenish purple, 7 - 14 cm
Kwiaty	green-yellow catkins, 2 - 4 cm, May
Owoce	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	fertile and moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Raimond Cinovskis, Riga, Latvia, 1946

Czerwonolistna odmiana Q. robur o szeroko jajowatej do zaokrąglonej koronie. Rośnie znacznie lepiej niż stara odmiana o purpurowych liściach 'Purpurascens'. Kora, kwitnienie i owoce są podobne do gatunku. Odwrócone, jajowate liście również mają kształt podobny do gatunku, ale są większe niż u odmiany 'Purpurascens'. Liście kielkują na zielono, ale stopniowo ciemnieją, aż w końcu późnym latem stają się błyszczące, ciemnozielono-fioletowe, a następnie czerwone. Drzewo zostało znalezione przez M. Timuki w 1939 roku, ale nazwane i rozpowszechnione dopiero w 1946 roku. Dobry wzrost i piękne kolory liści to główne cechy tego dębu o purpurowych liściach. Ponadto odmiana 'Timuki' jest znacznie mniej podatna na mączniaka.