



Robinia viscosa



Wysokość	6 - 10 (12) m
Szerokość	6-10m
Korona	broad ovoid, half-open crown
Kora i gałęzie	grey, rough grooves, brownish red twigs, very sticky
Liście	imparipinnate, with 11 - 21 leaf segments, green, 2 - 5 cm, feathered leaf
Kwiaty	tight clusters of light pink flowers, June/July
Owoce	flat pod, dark brown, very hairy, sticky, 4 - 8 cm
Kolce/ciernie	tak
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	places little demands on soil, provided there is good drainage
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	sensitive
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na sól sypaną na drogi
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na sól sypaną na drogi, drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	eastern and south-eastern USA

Dorasta do 12 m wysokości w swoim naturalnym zasięgu, w uprawie zwykle osiąga 8 m. Drzewo ma okrągłą lub szeroko jajowatą koronę. Najbardziej uderzające są liczne lepkie części. Brązowo-czerwone, niekolczaste gałązki są gęsto pokryte lepkimi włoskami gruczołowymi. Nieparzysto pierzaste liście składają się z 11-21 listków. Są one jajowate z zaokrąglonym końcem i mają 2-5 cm długości. Ciemnozielone i gładkie z wierzchu, szaro owłosione i lekko lepkie od spodu. Ciemnoczerwone ogonki liściowe są również lepkie. Kwitnienie remonstrantów rozpoczyna się w czerwcu i może trwać do sierpnia. Jasnoróżowe kwiaty tworzą grona o długości do około 10 cm. Kwiaty nie są pachnące. Jesienią pojawiają się płaskie rośliny strączkowe. Mają one od 4 do 8 cm długości i są gęsto pokryte lepkimi włoskami gruczołowymi.