



Sorbus alnifolia



Wysokość	8 - 12 (15) m
Szerokość	4-8m
Korona	ovoid to round, half-open crown
Kora i gałęzie	smooth dark grey bark, branches purplish-brown
Liście	oval, top with a short point, remarkable lateral veins, dull green, 5 - 11 cm
Kolor jesienny	Pomarańczowy, czerwony, purpurowy
Kwiaty	in umbels, Ø approx. 5 cm, white, May/June
Owoce	round to oval, red with yellow, Ø 0.8 - 1.5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	well drained nutritious soil
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	fairly
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	East Asia
Synonimy	Micromeles alnifolia

Pierwotnie rośnie w Azji Wschodniej i osiąga tam wysokość około 15 m. W Europie osiąga około 8-10 m. Drzewo ma ciemnoszarą, gładką korę. Młode gałązki są oliwkowobrązowe, a później stają się ciemniejsze. Pąki liściowe są uderzająco czerwono-brązowe. Owalny liść jest bardzo podobny do liścia olchy (Alnus). Ma 10-15 par wyraźnych żyłek, a brzeg liścia jest drobno podwójnie ząbkowany. Z wierzchu jest matowozielony, od spodu jasnozielony i słabo owłosiony do nagiego. Jesienią przebarwia się na odcienie różu, pomarańczy i czerwieni. Po kwitnieniu pojawiają się żółte owoce, które powoli stają się czerwone. W różnych stadiach rozwoju stanowią one szczególną wartość ozdobną jesienią. Do owocowania konieczne jest zapylenie krzyżowe, dlatego zaleca się sadzenie kilku okazów razem.