



Stewartia pseudocamellia



Wysokość	8 - 12 (15) m
Szerokość	4-6m
Korona	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	greyish brown, thin flakes, later reddish brown with grey spots
Liście	reverse ovoid to oval, dark green, 3 - 9 cm
Kolor jesienny	żółty, Pomarańczowy, czerwony, purpurowy
Kwiaty	white with yellow stamens, Ø approx. 5 - 6 cm, July/August
Owoce	woody capsule
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist, not too wet, peaty
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	fairly
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Japan, Korea

Mocny krzew do średnio wysokiego drzewa o szerokiej piramidalnej koronie, która ostatecznie staje się owalna. Gładka kora łuszczy się cienko w kolorach szarym, pomarańczowym do fioletowo-brązowego. Odśłania to charakterystyczną cynamonowo-brązową korę, tworząc dekoracyjny element. Gałązki są nagie; ciemnozielone liście są lekko owłosione podczas pączkowania. Na brzegach liście są bardzo drobno ząbkowane. Jesienne wybarwienie jest szczególnie piękne w odcieniach od żółto-czerwonego do czerwono-fioletowego. Pojedyncze kwiaty podobne do kwiatów kamelii pojawiają się w kątach liści. Kwitnienie może czasami trwać do sierpnia. Po kwitnieniu pojawiają się zdrewniałe kapsułki o wielkości około 2 cm. Otwierają się one u góry na 5 segmentów zawierających prawie czarne nasiona. Młode rośliny mogą zostać uszkodzone przez silne mrozy.