



Styrax obassia



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	5-8m
Korona	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	twigs reddish brown, bark grey, smooth
Liście	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
Kwiaty	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
Owoce	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	light loamy and humic soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Japan, Korea, Northern China

Bardzo duży krzew lub średnie do dużego drzewo o szerokiej, owalnej do okrągłej koronie. Młode gałązki są czerwono-brązowe, początkowo owłosione, później ciemnofioletowe i nagie lub lekko łuszczące się. Kora starszych drzew jest szara i gładka. Duże liście są prawie okrągłe z wyraźnie zaokrąglonym końcem. Są one ciemnozielone. Dwa dolne liście każdego pędu znajdują się prawie naprzeciwko siebie. Pozostałe liście są rozrzucone wzdłuż gałązki. Podstawa liści jest poszerzona, wklęsła i otacza pąk. Kwiaty otwierają się w czerwcu i zwisają w długich gronach. Pojedyncze kwiaty mają około 2 cm wielkości i są białe z żółtymi pręcikami. Mają bardzo silny i przyjemny zapach. Drzewo zwykle kwitnie bardzo obficie i jest wtedy bardzo lubiane przez pszczoły. Po kwiatach pojawiają się twarde, jajowate, białe do żółtawych pestkowce z ciemnozielonym kielichem.